

*Yüksek ısı ve güneş ışığına maruz kalmış aşılar ile ambalaj bütünlüğü bozulmuş aşılar kullanılmamalıdır.

*Aşı uygulanacak hayvanlar sağlıklı olmalıdır.

*Aşı uygulamalarında asepsi ve antisepsi kurallarına uyulmalıdır.

*Ender de olsa duyarlı hayvanlarda aşılamadan kısa süre sonra görülebilecek anafaktik şoklara karşı adrenarjik ve antihistaminik preparatlar uygulanmalıdır.

*BRUDOLL-M Genç yalnızca veteriner hekim veya hekim gözetimindeki sağlık teknisyenlerince uygulanmalıdır.

İstenmeyen etkiler: Enjeksiyon yerinde bazen görülebilecek küçük sert şişlikler ve geçici bir beden ısısı yükselmesi normal aşı reaksiyonu olarak değerlendirilir.

Yasal arınma süresi: Aşılı hayvanların 90 gün süreyle kesilmemesi tavsiye olunur.

Saklama koşulları: +2/+8°C buzdolabı ısısında

Ambalaj şekli:

25 doz liyofilize aşı ve 25 ml sulandırma sıvısı ile birlikte
50 doz liyofilize aşı ve 50 ml sulandırma sıvısı ile birlikte
100 doz liyofilize aşı ve 100 ml sulandırma sıvısı ile birlikte
200 doz liyofilize aşı ve 200 ml sulandırma sıvısı ile birlikte

İmha şartları: Sulandırılıp kullanılmayan aşılar 15 dakika kaynatılarak imha edilir. Liyofilize şekildeki kullanılmayan aşılar ise imha için üretici kuruma iade edilir.

“SADECE VETERİNER KULLANIM İÇİNDİR”

Üretici Firma :

DOLLVET Veteriner Aşı, İlaç, Biyolojik Madde Üretimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi 8. Cadde ŞANLIURFA
Tel : 0 414 369 11 33 • Fax : 0 414 369 16 62
www.dollvet.com.tr • dollvet@dollvet.com.tr



BRUDOLL-M Genç



Liyofilize Brucella melitensis Rev 1 Aşısı



LİYOFİLİZE BRUDOLL-M Genç AŞISI PROSPEKTÜSÜ

BRUDOLL-M Genç koyun ve keçilerin brusellozis'ine karşı hazırlanmış canlı attenüe liyofilize Brucella melitensis Rev-1 aşısı

Kompozisyonu: Bir doz aşı;

Attenüe Brucella melitensis Rev 1	0,5-4X109 CFU/doz
Enzymatic digest of Proteins / Casein	0,125 mg/doz
Sukroz	0,25 mg/doz
Sodyum glutamate	0,05 mg/doz
HEPES	0,01 mmol/doz

Endikasyon: 4-6 aylık koyun ve keçilerde brusellozis'e karşı koruyucu amaçla kullanılır.

Kontraendikasyon: Gebe ve laktasyondaki hayvanlarda ve ergin erkek hayvanlarda kullanılmamalıdır.

Uygulama ve dozaj: 4-6 aylık dişi ve erkek kuzu ve oğlaklara koltuk atı yünsüz bölgeden 1 ml deri altı yolla uygulanır. 6 aylıktan büyük hayvanlara uygulanmaz.

Uyarılar: Liyofilize aşı steril bir enjektöre çekilen 3-4 ml sulandırma sıvısı ile homojenize edilerek aynı enjektörle sulandırma sıvısına katılıp, çalkalanarak uygulamaya hazır hale getirilir. Aşı şişesi çalkalama işlemi aşılama sonuçlanıncaya kadar tekrarlanmalıdır.

*Sulandırılan aşı en geç 2 saat içinde tüketilmelidir.

*Brucella melitensis Rev 1 attenüe suş olmasına rağmen insanlarda hastalık yapmaya muktedirdir. Dolayısı ile bakteri ile uygun biyogüvenlik önlemleri alınarak çalışılmalıdır. Aşının sulandırılması ve sulandırılmış aşının uygulanması esnasında hatalı enjeksiyon, göz ve deri kontaminasyonundan kaçınılmalıdır. Uygulama esnasında asepsi ve antisepsi kurallarına uyulmalıdır. Aşılama esnasında eldiven kullanılmalı ve gerektiğinde kullanılmak üzere antiseptik solüsyon hazır bulundurulmalıdır. Aşılama sonrası enjeksiyon ekipmanı uygun dezenfektanlarla (fenollü, iyotlu veya aldehitli) dekontamine edilmelidir. Kazara oluşabilecek temaslarda tıbbi müdahale aranmalıdır. *Aşı sığırlar için tehlikeli olabileceğinden, aşılı hayvanların sığırlar ile teması önlenmelidir.