

Uyarılar:

- *Aşılamaya başlarken aşı şişeleri kuvvetli şekilde çalkalanmalı ve bu işleme aşılama sonuna kadar devam edilmelidir.
- *Açılan her aşı şişesi aynı gün içinde kullanılmalıdır. Yarım kalan veya boşalan aşı şişeleri usulüne uygun olarak imha edilmelidir.
- *Yüksek ısı ve güneş ışığına maruz kalmış aşılar ile donmuş aşılar asla kullanılmamalıdır.
- *Aşı uygulanacak hayvanlar sağlıklı olmalıdır.
- *Aşı uygulamalarında asepti ve antisepsi kurallarına uyulmalıdır.
- *Enderde olsa duyarlı hayvanlarda aşılama kısa süre sonra görülebilecek anaflaktik şoklara karşı adrenarjik ve antihistaminik preparatlar uygulanmalıdır.
- *Aşının gebe hayvanlara uygulanmasında bir sakınca yok ise de ileri derecedeki gebelere (koyun ve keçilerde gebeliğin son 1/3'ünde) uygulanması önerilmemektedir.
- *ENTDOLL yalnızca Veteriner Hekim veya Hekim gözetimindeki Veteriner Sağlık Teknisyenlerince uygulanmalıdır.

Yan Etkileri: Aşı uygulama yerinde görülen fındık büyüklüğünden ceviz büyüklüğüne kadar değişen ve sonradan kaybolan nodüller normal aşı reaksiyonudur.

Yasal Arınma Süresi: Avrupa Birliği'nin 2001/82/EC direktifinin 10/2 maddesine göre yasal arınma süresi aşılama sonrası asgari 28 gündür.

Saklama Koşulları: +2/+8 °C de ve karanlıkta muhafaza edilmelidir.

Ambalaj Şekli: 50 ve 100 ml lik renkli ve tip II cam şişelerde (European Pharmacopoeia, 2005 3.2.1-3.2.2) silikon tapalı ve alüminyum kapaklı olarak 33 ve 66 koyun dozu şeklinde ambalajlanmıştır.

İmha Şartları: Kullanım şartlarına haiz olmayan aşılar, (yüksek ısı veya güneş ışığına maruz kalmış, donmuş, ambalaj bütünlü bozulmuş, kapak, tapa veya etiket orijinalliğini yitirmiş) üretici kurum olan Dollvet A.Ş.' ne bildirilir. Aşılar otoklavla sterilize edildikten sonra boşaltılır, boşalan şişeler cam konteynıra atılır.

“SADECE VETERİNER KULLANIM İÇİNDİR”

Üretici Firma :

DOLLVET Veteriner Aşı, İlaç, Biyolojik Madde Üretimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi 8. Cadde ŞANLIURFA
Tel : 0 414 369 11 33 • Fax : 0 414 369 16 62
www.dollvet.com.tr • dollvet@dollvet.com.tr



ENTDOLL



Bivalan Enterotoksemi Aşısı



Cl. perfringens tip C • Cl. perfringens tip D

ENTDOLL AŞI PROSPEKTÜSÜ

Kompozisyon: Cl. perfringens tip C ve Cl. perfringens tip D kültürleri ile hazırlanıp, formol ile toksin inaktivasyonuna tabi tutulmuş, alüminyum hidroksit ile adjuvantlanmış, fenol katılmış, anakültür konsantre toksoid bivalan bir aşıdır.

Endikasyonları ve Kontraendikasyonları: Koyun, keçi, kuzu ve oğlaklarda Enterotoksemi'lere (struck, pulpy kidney, lamb dysentery) karşı koruyucu amaç ile uygulanır. Hasta veya inkubasyon periyodundaki hayvanlara uygulanmamalıdır.

Uygulama ve Dozaj: Aşı; koyun, keçi, kuzu ve oğlaklarda skapula gerisindeki yünsüz ve hareketsiz bölgeye, 21 gün ara ile koyun ve keçilere 1,0+0,5 ml, kuzu ve oğlaklara 0,5+0,5 ml dozlarında Enterotoksemi'lere karşı uygulanır. Daha önce aşılanmış koyun, keçi, kuzu ve oğlakların 6 ay sonra aşılama programında bildirilen tek doz aşı ile aşılama yeterlidir.

Aşılama Programı

HAYVAN TÜRÜ	AŞI UYGULAMA YERİ	AŞI DOZU ve AŞILAMA PERİYODU		
		1.AŞILAMA	2.AŞILAMA (21 gün sonra)	3.AŞILAMA (6 ay sonra)
KOYUN /KEÇİ	Koltuk altı yünsüz ve hareketsiz bölge	1 ml	0,5 ml	1 ml
KUZU/OĞLAK	Koltuk altı yünsüz ve hareketsiz bölge	0,5 ml	0,5 ml	1 ml