

Uyarılar : Aşılamaya başlarken aşı şişeleri kuvvetli şekilde çalkalanmalı ve bu işleme aşılama sonuna kadar devam edilmelidir.

*Açılan her aşı şişesi aynı gün içinde kullanılmalıdır. Yarım kalan veya boşalan aşı şişeleri usulüne uygun olarak imha edilmelidir.

*Yüksek ısı ve güneş ışığına maruz kalmış aşılar ile donmuş aşılar asla kullanılmamalıdır.

*Aşı uygulanacak hayvanlar sağlıklı olmalıdır.

*Aşı uygulamalarında asepsi ve antisepsi kurallarına uyulmalıdır.

*Enderde olsa duyarlı hayvanlarda aşılamadan kısa süre sonra görülebilecek anafilaktik şoklara karşı adrenajik ve antihistaminik preparatlar uygulanmalıdır.

*Aşının gebe hayvanlara uygulanmasında bir sakınca yok ise de, ileri derece gebelere (sığır, koyun ve keçilerde gebeliğin son 1/3'ünde) uygulanması önerilmemektedir.

*KARADOLL yalnızca veteriner hekim veya hekim gözetimindeki sağlık teknisyenlerince uygulanmalıdır.

Yan Etkileri : Aşı uygulama yerinde görülen fındık büyüklüğünden ceviz büyüklüğüne kadar değişen ve sonradan kaybolan nodüller normal aşı reaksiyonudur.

Yasal Arınma Süresi: Avrupa Birliği'nin 2001/82/EC sayılı direktifinin 10/2 maddesine göre yasal arınma süresi aşılamadan sonra asgari 28 gündür.

Saklama Koşulları: +2/+8 °C de ve karanlıkta muhafaza edilmelidir.

Ambalaj Şekli: 10, 20, 50 ve 100ml'lik renkli cam (tip II) ve plastik şişelerde butil tapalı ve alüminyum kapaklı olarak 10, 20, 50 ve 100 koyun dozu; 5, 10, 25 ve 50 sığır dozu şeklinde ambalajlanmıştır.

İmha Şartları: Kullanım şartlarına haiz olmayan aşılar (yüksek ısı veya güneş ışığına maruz kalmış, ambalaj bütünlüğü bozulmuş, kapak, tıpa veya etiket orijinalliğini yitirmiş) üretici kurum olan Dollvet A.Ş.'ne bildirilir. Aşılar otoklavda sterilize edildikten sonra boşaltılır, boşalan şişeler cam şişeler konteynıra atılır.

“SADECE VETERİNER KULLANIM İÇİNDİR”

Üretici Firma :

DOLLVET Veteriner Aşı, İlaç, Biyolojik Madde Üretimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi 8. Cadde ŞANLIURFA
Tel : 0 414 369 11 33 • Fax : 0 414 369 16 62
www.dollvet.com.tr • dollvet@dollvet.com.tr



KARADOLL



Yanıkara Aşısı



Cl. chauvoei

Sığır, Koyun Keçi, Buzağı, Kuzu ve Oğlakların Yanıkara Enfeksiyonuna Karşı Anakültür Toksoid İnaktif Monovalan Aşı

Kompozisyon: Cl. chauvoei aşı suşu ile hazırlanmış, formol ile inaktive edilmiş, alüminyum hidroksit adjuvantlı, fenollü, anakültür toksoid, monovalan inaktif bir aşıdır.

Endikasyonları ve Kontrendikasyonları: Yanıkara' ya karşı sığır, koyun ve keçilerde koruyucu amaç ile uygulanır. Hasta veya inkubasyon periyodundaki hayvanlara uygulanmamalıdır.

Uygulama ve Dozaj: Aşı 4.aydan itibaren her yaştaki sağlıklı sığır, koyun, keçi, buzağı, kuzu ve oğlaklara deri altı (sc) yolla tatbik edilir.

Aşılama Programı

HAYVAN TÜRÜ	AŞI UYGULAMA YERİ	AŞI DOZU ve AŞILAMA PERİYODU	
		1.AŞILAMA	Yıllık Periyodik Aşılama
Sığır	Omuz gerisindeki hareketsiz bölge	2 ml / sc	2 ml / sc
Buzağı	Omuz gerisindeki hareketsiz bölge	1 ml / sc	1 ml / sc
Koyun / Keçi	Koltuk Altı yünsüz ve hareketsiz bölge	1 ml / sc	1 ml / sc
Kuzu / Oğlak	Koltuk Altı yünsüz ve hareketsiz bölge	0,5 ml / sc	0,5 ml / sc