

- \*Aşı uygulanacak hayvanlar sağlıklı olmalıdır.
- \*Aşı uygulamalarında asepsi ve antisepsi kurallarına uyulmalıdır.
- \*Ender de olsa duyarlı hayvanlarda aşılardan kısa süre sonra görülebilecek anaflaktik şoklara karşı adrenarjik ve antihistaminik preparatlar uygulanmalıdır.
- \*Laktasyonun ilk iki aylık dönemi ile gebeliğin son iki aylık dönemindeki hayvanlara uygulanmamalıdır.
- \*LAXYDOLL yalnızca veteriner hekim veya hekim gözetimindeki veteriner sağlık teknisyenlerince uygulanmalıdır.

**Yan Etkileri:** Herhangi bir lokal veya genel reaksiyonu yoktur.

**Yasal Arınma Süresi:** Avrupa Birliği'nin 2001/82/EC sayılı direktifinin 10/2 maddesine göre aksi belirtilmedikçe yasal arınma süresi aşılardan sonra süt için asgari 7, et için asgari 28 gündür.

**Saklama Koşulları:** Aşı +2/+8°C'de ve karanlıkta saklanmalıdır.

**Ambalaj Bilgileri:** Aşı, 50 ve 100 dozluk liyofilize kültürün bulunduğu tip 1 beyaz cam flasklarda silikon tapalı ve alüminyum kapaklı olarak etiketlenmiştir, liyofilize flasklar renkli tip II cam şişelerdeki (European Pharmacopoeia, 2005,3.2.1-3.2.2) 50 ve 100 ml lik özel sulandırma sıvısı ile birlikte ambalajlanmıştır. Şişelerin analiz sertifikaları Ek-6' dadır.

**İmha Koşulları:** Kullanım şartlarına haiz olmayan aşılar (yüksek ısı veya güneş ışığına maruz kalmış, donmuş, ambalaj bütünlüğü bozulmuş, kapak, tıpa veya etiket orijinalliyini yitirmiş) üretici kurum olan DOLLVET A.Ş'ne bildirilir. Aşılar otoklavda sterilize edildikten sonra boşaltılır, boşalan şişeler cam konteynirine atılır.

**“SADECE VETERİNER KULLANIM İÇİNDİR”**



**Üretici Firma :**

DOLLVET Veteriner Aşı, İlaç, Biyolojik Madde Üretimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
Organize Sanayi Bölgesi 8. Cadde ŞANLIURFA  
Tel : 0 414 369 11 33 • Fax : 0 414 369 16 62  
www.dollvet.com.tr • dollvet@dollvet.com.tr

# LAXYDOLL



Liyofilize Agalaksi Aşısı

## LAXYDOLL AŞI PROSPEKTÜSÜ

**Kompozisyon:** Aşı Attenüe AIK Mycoplasma agalactiae aşı suşu ile hazırlanmış liyofilize canlı bakteriyel kültür ve kültüre ait sulandırma sıvısından oluşan monovalan bir aşıdır.

**Endikasyonları ve Kontraendikasyonları:** Koyun ve keçilerin bulaşıcı Agalaksi'sine karşı uygulanır. Hasta veya inkubasyon periyodundaki hayvanlara uygulanmamalıdır.

**Uygulama ve Dozaj:** Scapula gerisindeki koltuk altı yünsüz ve hareketsiz bölgeye 1 ml dozunda deri altı uygulanır.

### Aşılama Programı

HAYVAN TÜRÜ	AŞI UYGULAMA YERİ	AŞI DOZU ve AŞILAMA PERİYODU	
		1.AŞILAMA	2.AŞILAMA (1 yıl sonra)
KOYUN / KEÇİ	Koltuk altı yünsüz ve hareketsiz bölge	1 ml SC	1 ml SC

**Uyarılar:** Aşılamaya başlarken liyofilize aşı tableti 2-3 ml sulandırma sıvısı ile homojenize edilir. İçerik enjektörle çekilerek sulandırma sıvısına ilave edilir. Bu işlem birkaç defa tekrarlanır. Aşı şişesi aralıklarla kuvvetli şekilde çalkalanmalı ve bu işleme aşılamaya sonuna kadar devam edilmelidir.

\*Sulandırılan aşı en geç 2 saat içinde tüketilmelidir. Yarım kalan veya boşalan şişeler usulüne uygun olarak imha edilmelidir.

\*Yüksek ısı ve güneş ışığına maruz kalmış aşılar ile donmuş aşılar asla kullanılmamalıdır.