

Çiçek

sadece dalında güzeldir...



POXDOLL
Liyofilize Koyun - Keçi Çiçek Aşısı



POXDOLL

Liyofilize Koyun - Keçi Çiçek Aşısı



KOYUN KEÇİ ÇİÇEK HASTALIĞI

Koyun ve keçilerde deri lezyonları ile karakterize özellikle genç hayvanlarda ölüm oranı yüksek bulaşıcı viral bir hastalıktır. Hastalık etkeni capripoxvirus grubunda yer alır ve çevre şartlarında uzun süre canlılığını muhafaza eder (kurumuş deri lezyon kabuklarında ve yünlerde 2-6 ay canlı kalabilir). Endemik bölgelerde **morbidite %70-90** mortalite ise %5-10 arasında değişiklik gösterir. **Hassas ırk ve genç hayvanlarda mortalite %100'e ulaşabilir.**

En önemli bulaşma şekli direkt temas ve inhalasyon yoludur. İnkübasyon süresi 3-21 gün (genellikle 8-13 gün) arasında değişiklik gösterir. Yüksek ateş, düşünlük, konjunktivitis derinin kılsız bölgelerinde çiçek lezyonları (konjesyon, hemoraji, vasculitis, papulo-veziküler, nodüller ve nekrozlar) ve akciğerlerde oluşan nodüllere bağlı olarak şekillenen bronkopnömoniye bağlı öksürük en belirgin klinik semptomlardır.

Spesifik bir tedavi şekli yoktur. Hasta sürü ve hayvanların izolasyonu, karantina tedbirleri ve dezenfeksiyon uygulanarak hastalığın yayılması önenebilir. **Sağlıklı sürülerde ise en etkin koruma yolu aşı uygulamasıdır.**



Keçi: Burun dudak lezyonları, çok sayıda papüller mevcut ve bölge kısmi olarak hemorajik nazal eksudat ile kaplı.



Keçi: Deri lezyonları, nekrotik papüller.



Koyun: Testis ve kasık bölgesi lezyonları. Kırmızı kahverenkli papüller ve hemorajik ülserler.



Akciğer: Kabarık ve soluk renkli nodüller (multifokal pnömoni)

Kaynak: Plum Island Animal Disease Center (PIADC), Greenport, NY Resimler "www.cfsph.iastate.edu" adresinden alınmıştır.

POXDOLL

POXDOLL koyun keçi çiçeği hastalığına karşı kuzu böbrek hücre kültürlerinde hazırlanan canlı attenüe liyofilize bir aşıdır.

Aşı Kompozisyonu:

Beher doz aşı minimum ;

Attenüe SPV (Bk)	10 ^{2,5} DKID ₅₀ /doz
Lactalbumin hydrolysate	0,25mg/doz
Sucrose	0,50mg /doz içerir

Endikasyon:

Koyun ve keçilerde koyun keçi çiçek hastalığına karşı koruyucu amaçla kullanılır.

Uygulama ve dozaj:

Aşı dozu:

6-12 haftalık kuzu ve oğlaklara 0,2 ml,

12 haftalıktan büyük yaştaki hayvanlara 0,5 ml dir;

Koyun ve kuzularda koltuk altı yünsüz bölgeye, keçi ve oğlaklarda kuyruk altına deri altı yolla uygulanır.

Koruyucu aşılama hastalık çıkan bölgelerde hastalığı takip eden iki yıl, yılda bir defa uygulanır.

Ambalaj şekli: 1ml 50 doz liyofilize aşı ve 25 ml sulandırma sıvısı, 1ml 100 doz liyofilize aşı ve 50 ml sulandırma sıvısı ile birlikte ticari sunum.



Sağlıklı sürülerin koyun - keçi çiçek hastalığından korunması için en etkili metod **AŞILAMADIR**



Dollvet Veteriner Aşı İlaç Biyolojik Madde Üretimi Sanayi ve Tic. A.Ş.

Tel : + 90 414 369 11 33

Fax : + 90 414 369 16 62

Organize Sanayi Bölgesi 8. Cad.

ŞANLIURFA / TÜRKİYE

www.dollvet.com.tr • dollvet@dollvet.com.tr

Sizin kadar

ÖNEMSİYORUZ