

İstenmeyen etkiler: Geçici bir beden ısısı yükselmesi görülebilir. Aşı uygulama bölgesinde sert veya yumuşak şişlikler (0.2-5 cm çapında) ve kuru nekrotik kabuklar oluşabilir. % 0,4'e kadar lokal ve genel ferdi aşı reaksiyonları görülebilir.

Yasal arınma süresi: Yoktur.

Saklama koşulları: +2/+8 °C' de ve karanlıkta muhafaza edilmelidir.

Ambalaj şekli: 1 ml 50 doz liyofilize aşı ve 25 ml sulandırma sıvısı veya 1 ml 100 doz liyofilize aşı ve 50 ml sulandırma sıvısı ile birlikte ticari sunum.

İmha şartları: Sulandırılıp kullanılmayan aşılar 15 dakika kaynatılarak imha edilir. Liyofilize şeklindeki kullanılmayan aşılar ise imha için üretici kuruma iade edilir.

“SADECE VETERİNER KULLANIM İÇİNDİR”



Üretici Firma :

DOLLVET Veteriner Aşı, İlaç, Biyolojik Madde Üretimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi 8. Cadde ŞANLIURFA
Tel : 0 414 369 11 33 • Fax : 0 414 369 16 62
www.dollvet.com.tr • dollvet@dollvet.com.tr

POXDOLL



Liyofilize Koyun - Keçi Çiçek Aşısı



LİYOFİLİZE POXDOLL AŞISI PROSPEKTÜSÜ

POXDOLL koyun keçi çiçeği hastalığına karşı kuzu böbrek hücre kültürlerinde hazırlanan canlı attenüe liyofilize bir aşıdır.

Kompozisyonu: Beher doz aşı içeriği minimum;
Attenüe SPV (Bk) 10^{2,5} DKID₅₀/doz
Lactalbumin hydrolysate 0,25 mg/doz
Sucrose 0,50 mg /doz

Endikasyon: Koyun ve keçilerde koyun keçi çiçek hastalığına karşı koruyucu amaçla kullanılır.

Kontraendikasyon: Yoktur.

Uygulama ve dozaj: Aşı dozu 6-12 haftalık kuzu ve oğlaklara 0,2 ml, 12 haftalıktan büyük yaştaki hayvanlara 0,5 ml dir; koyun ve kuzularda koltuk altı yünsüz bölgeye, keçi ve oğlaklarda kuyruk altına deri altı yolla uygulanır. Koruyucu aşılama hastalık çıkan bölgelerde hastalığı takip eden iki yıl, yılda bir defa uygulanır. Koruyucu amaçla aşılamaların sonbahar mevsiminin başlarında yapılması önerilir.

Uyarılar: Gebe koyun ve keçilerde gebeliğin son 1/3'ünde (gebeliğin son 6 haftasında) ve doğumu takip eden ilk ayda ve hastalık çıkmayan yerlerde ve 6 haftalıktan küçük oğlak ve kuzulara aşı uygulanmaz. Hasta ve inkubasyon dönemindeki sirayetten şüpheli hayvanlar aşılanmamalıdır. Aşı naklinde ve uygulanmasında soğuk şartlar sağlanmalı, liyofilize aşı sulandırma sıvıları soğutulduktan sonra steril enjektör kullanılarak sulandırılmalıdır. Eritilen aşılar sulandırma sıvısı içinde iyice karıştırılmalıdır ve enjektöre her aşı çekilişinde sulandırılan aşı çalkalanmalıdır. Aşılama sırasında asepsi antisepsi kurallarına uyulmalı sulandırılan aşı direk güneş ışığına maruz bırakılmamalı mümkünse buz içinde bulundurulmalıdır. Sulandırılan aşı en geç 2 (iki) saat içinde kullanılmalıdır. Aşılamada kullanılan enjektörlerin sterilizasyonunda kesinlikle dezenfektan ve antiseptikler kullanılmamalıdır.