

**Uyarılar:** Serum kullanım öncesi oda sıcaklığına getirilmeli ve çalkalanarak homojenize edilmelidir. Diplerinde anormal ölçüde tortu bulunan serum şişeleri kullanılmamalıdır.

**Yan etkiler:** Yan etkisi yoktur.

**Yasal arınma süresi:** Serum herhangi bir aktif komponent içermemektedir. Yasal arınma süresi immun serum preparatlarla ilgili değildir

**Saklama koşulları:** +2/+8°C sıcaklıkta ve karanlıkta dondurulmadan muhafaza edilmelidir.

**Ambalaj şekli:** Serum bal rengi Tip 2 cam şişelerde 5 ml (1 koruyucu doz), 10 ml (2 koruyucu doz veya bir tedavi dozu), 50 ml (10 koruyucu doz veya 5 tedavi dozu) olarak ambalajlanmıştır. Şişeler bütül tıpa ve alüminyum kapak ile kapatılarak etiketlenir.

**İmha Koşulları:** Raf ömrü dolmuş, ambalaj bütünlüğü bozulmuş, kapak,tıpa veya etiket orijinalliğini yitirmiş, açılmış ve saklama koşullarına uyulmadan muhafaza edilmiş hiperimmun serumlar 15 dakika kaynatılarak imha edilir.

**“SADECE VETERİNER KULLANIM İÇİNDİR”**



**Üretici Firma :**

DOLLVET Veteriner Aşı, İlaç, Biyolojik Madde Üretimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
Organize Sanayi Bölgesi 8. Cadde ŞANLIURFA  
Tel : 0 414 369 11 33 • Fax : 0 414 369 16 62  
www.dollvet.com.tr • dollvet@dollvet.com.tr

**Dollvet**

# SERADOLL



## Buzağı Septisemi Serumu

### SERADOLL AŞI PROSPEKTÜSÜ

Yeni doğmuş buzağuların E.coli'den ileri gelen septisemilerinden korunması amacıyla kullanılan enjektabl hiperimmun serumdur.

**Ürün kompozisyonu :**

**Aktif maddeler:** E.coli'nin EC (O101: H-K99+F41+) ve 11A ( O?:H-K99+., F(Y)+) suşlarına karşı spesifik antikor

**Ek maddeler:** % 0,4 fenol

**Endikasyonları:** Buzağı hiperimmun serumu yeni doğan buzağuları E.coli'den ileri gelen septisemilere karşı korumak ve tedavi etmek amacıyla kullanılır.

**Kontraendikasyonları:** Herhangi bir kontraendikasyonu yoktur.

**Uygulama şekli ve dozu:** Serum koruyucu amaçla yeni doğmuş buzağılara 5 ml deri altı yolla verilir. Tedavi amacıyla semptomların görüldüğü ilk dönemde 10 ml kas içi veya deri altı yolla uygulanır.

Hayvan Türü	Aşı Uygulama Yeri	Aşı Dozu ve Aşılama Periyodu	
		İlk Aşılama	Yıllık Periyodik Aşılama
Buzağular	Omuz gerisinde ki hareketsiz bölge	5 ml / sc (Doğumun ilk saatlerinden itibaren)	10 ml / im - sc