

Theileria'dan

bu şekilde
koruyamazsınız

korumanın
daha etkin yolu var



TAYLEDOLL
Theileria Annulata Aşısı





Theileriosis (Zehirli Sıtma)

Theileriosis sığırların kenelerle bulaşan, halk arasında sıtma olarak da bilinen bir hastalığı olup etkeni *Theileria* cinsine mensup intraselüler protozoalardır. *T. annulata*, *Hyalomma* cinsi keneler vasıtası ile yayılır ve hastalık tropikal theileriosis (Zehirli Sıtma) olarak bilinir. Hastalığın inkubasyon süresi 10-25 gün arasındadır.


Tropikal theileriosis'in başlıca klinik belirtileri yüksek ateş, yüzeysel lenf yumrularının büyümesi, müköz membranlarda solukluk, iştahsızlık, kondisyon kaybı ve hemoglobinin düşmesi sayılabilir. Sarılık ve anemi de en belirgin semptomlar arasındadır. Ayrıca göz ve burun akıntısı, solunumun hızlanması ve ishal de görülebilir. Tam duyarlı hayvanlarda hastalık genellikle ölümle sonuçlanır.

Tropikal theileriosis'te mortalite oranı parazit suşuna ve hayvanların duyarlılığına bağlı olarak %3-90 arasında değişiklik gösterir.

Theileriosis'in kontrolünde yaygın olarak kullanılan ve en pratik metod kenelerin akarisitlerle kimyasal olarak kontrolüdür. Ancak bu metod sürekli akarisit kullanımını gerektirdiğinden pahalı ve zahmetli bir yöntemdir. Çevre kirlenmesi ve akarisitlere dirençli kenelerin seleksiyonu da bu yöntemin

sakıncalarıdır. Hastalığın tedavisinde kemoterapi de kullanılabilir ve erken dönemlerde oldukça etkilidir. Ancak çok pahalı oluşunun yanısıra, verimi düşürmesi, immun sistemi tahrip etmesi ve direnç oluşumu gibi olumsuz etkileri vardır.

Theileria annulata'da biyolojik döngü



(www.theileria.org adresinden yararlanılmıştır)

Theileria'dan korunmanın en etkili ve en ekonomik yolu AŞILAMADIR.

TAYLEDOLL

TAYLEDOLL sığırların Theileriosis hastalığına karşı attenüe *Theileria annulata* şizontları ile enfekte hücre kültürü aşısıdır.

Aşı kompozisyonu:

Theileria annulata şizontu taşıyan 10^7 canlı lenfoid hücre içermektedir.

Uygulama şekli ve dozu:

Çözdürülen 2,5 ml (5 doz) attenüe *Theileria annulata* makroşizontları ile enfekte hücre kültürü aşısı, aşıyla birlikte verilen 10 ml özel sulandırma sıvısı içinde yavaşça sulandırılır. Sulandırılan aşıdan 3 aylık ve 3 aylıktan büyük her yaştaki ve ırktaki sığırlara 2,5 ml olarak preskapular lenf yumrularının yukarısına deri altı yolla uygulanır. Çözdürülen aşı yarım saat içerisinde kullanılmalıdır.

Aşılama takvimi:

Aşılanan hayvanlarda koruyucu düzeyde bağışıklık 45 gün sonra oluşur. Aşı iklim koşullarına bağlı olarak hastalık mevsiminden en az iki ay önce uygulanmalıdır.

Ambalaj şekli:

2,5 ml (5 doz) aşı ve 10 ml sulandırma sıvıları ile birlikte ambalajlanmıştır.



Dollvet Veteriner Aşı İlaç Biyolojik Madde Üretimi Sanayi ve Tic. A.Ş.

Tel : +90 414 369 11 33

Fax : +90 414 369 16 62

Organize Sanayi Bölgesi 8. Cad.

ŞANLIURFA / TÜRKİYE

www.dollvet.com.tr • dollvet@dollvet.com.tr

Sizin kadar

ÖNEMSIYORUZ