

TAYLEDOLL



Theileria Annulata Aşısı

ATTENÜE THEILERIA ANNUATA AŞISI PROSPEKTÜSÜ

TAYLEDOLL sığırların Theileriosis hastalığına karşı attenüe Theileria annulata şizontları ile enfekte hücre kültürü aşısıdır.

Aşı kompozisyonu:

Bir aşı dozu 1×10^7 canlı attenüe Theileria annulata makroşizontları ile enfekte lenfoid hücre içerir.

Endikasyonlar:

Aşı klinik olarak sağlıklı sığırları Tropikal theileriosis'e (Theileria annulata enfeksiyonuna) karşı korumak için uygulanır.

Kontraendikasyonlar:

Aşı sadece sağlıklı hayvanlara uygulanır. Doğumuna 3 hafta kalmış gebe hayvanlara uygulanmamalıdır.

Uygulama şekli ve dozu:

Aşı 3 aylıktan büyük her yaştaki ve ırktaki sığırlara 2,5 ml olarak boyun bölgesinde prescapular lenf yumrusunun yukarısına deri altı yolla uygulanır.

Aşı uygulanacağı zaman aşı şişesi kanisterden alınır. Sıvı azot içerisinde çıkartılan şişe, içerisine sızmış olan sıvı azotun buharlaşması için 10-15 sn bekletildikten sonra 37°C su içerisinde veya avuç içinde hızlı bir şekilde çözündürülür.

Çözdürülen attenüe Theileria annulata makroşizontları ile enfekte hücre kültürü aşısı, hücrelerin parçalanmasını önlemek için kalın uçlu iğne takılmış enjektör yardımıyla aşıyla birlikte verilen özel sulandırma sıvısı içinde yavaşça sulandırılır ve sulandırılan aşidan her hayvana 2,5 ml deri altı uygulanır.

Uyarılar:

- Aşı sağlıklı hayvanlara uygulanmalıdır.
- Aşı uygulanırken asepti ve antiseptiye dikkat edilmelidir.
- Aşılar sıvı azot taşıyıcı tankları içerisinde saklanmalı ve nakledilmelidir. Saklama ve aşılama esnasında sıvı azot tanklarının dik durması ve azot seviyesinin ölçülmesi zorunludur.

- Aşılar sıvı azot taşıyıcı tankları içerisinde nakledildiği için aşı kullanılacağı zaman tanktan çıkartıldığında aşı şişesi ani ısı değişikliklerine bağlı olarak patlayabilir. Bu nedenle aşı şişesi sıvı azot içerisinde pens yardımıyla koruyucu eldiven, maske ve gözlük takılarak çıkartılmalı, çıkartıldıktan sonra şişenin içindeki gazın çıkması için 10-15 sn bekletilmeli, daha sonra 37°C su içerisinde daldırılmalı veya avuç içerisinde kağıt havluya sarılarak çözündürülmelidir.
- Su içerisinde çözündürülen aşı şişelerinin içerisine su girmemesine dikkat etmelidir.
- Aşı çözündürüldükten sonra yarım saat içerisinde kullanılmalıdır.

Aşılama takvimi:

Aşılanan hayvanlarda koruyucu düzeyde bağışıklık 45 gün sonra oluşur. Aşı iklim koşullarına bağlı olarak Tropikal theileriosis vektörü olan kenelerin etkinliğinin başlamasından en az iki ay önce uygulanmalıdır.

Yan etkiler:

Aşı yapılan hayvanlarda hafif bir ateş yükselmesi ve aşılama yerindeki preskapular lenf yumrularında hafif bir büyüme görülebilir.

Yasal arınma süresi:

Yasal arınma süresi yoktur.

Saklama:

Aşılar sıvı azot içerisinde özel taşıyıcı tanklarda saklanmalıdır. Sulandırma sıvıları oda sıcaklığında muhafaza edilir.

Ambalaj şekli:

5 doz canlı attenüe Theileria annulata aşısı (2.5 ml) ve 10 ml sulandırma sıvısı
10 doz canlı attenüe Theileria annulata aşısı (3 ml) ve 22 ml sulandırma sıvısı

İmha:

Raf ömrü dolmuş veya açılmış ve saklama koşullarına uyulmadan muhafaza edilmiş aşıların, 100°C'de kaynatılarak veya otoklav edilerek imha edilmesi gerekir.

“SADECE VETERİNER KULLANIM İÇİNDİR”



Dollvet

Üretici Firma :

DOLLVET Veteriner Aşı, İlaç, Biyolojik Madde Üretimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi 8. Cadde ŞANLIURFA
Tel : 0 414 369 11 33 • Fax : 0 414 369 16 62
www.dollvet.com.tr • dollvet@dollvet.com.tr