

### Uyarılar:

- \*Aşılamaya başlarken aşı şişeleri kuvvetli şekilde çalkalanmalı ve bu işleme aşılamaya sonuna kadar devam edilmelidir.
- \*Açılan her aşı şişesi aynı gün içinde kullanılmalıdır. Yarım kalan veya boşalan aşı şişeleri usulüne uygun olarak imha edilmelidir.
- \*Yüksek ısı ve güneş ışığına maruz kalmış aşilar ile donmuş aşilar asla kullanılmamalıdır.
- \*Aşı uygulanacak hayvanlar sağlıklı olmalıdır.
- \*Aşı uygulamalarında asepti ve antisepti kurallarına uyulmalıdır.
- \*Enderde olsa duyarlı hayvanlarda aşılamadan kısa süre sonra görülebilecek anaflaktik şoklara karşı adrenarjik ve antihistaminik preparatlar uygulanmalıdır.
- \*Aşının gebe hayvanlara uygulanmasında bir sakınca yok ise de, ileri derecedeki gebelere (sığır, koyun ve keçilerde gebeliğin son 1/3'ünde uygulanması önerilmemektedir).
- \*TETRANDOLL yalnızca Veteriner Hekim veya Hekim gözetimindeki Veteriner Sağlık Teknisyenlerince uygulanmalıdır.

**Yan Etkileri:** Aşı uygulama yerinde görülen fındık büyüklüğünden ceviz büyüklüğüne kadar değişen ve sonradan kaybolan nodüller normal aşı reaksiyonudur.

**Yasal Arınma Süresi:** Avrupa Birliği'nin 2001/82/EC direktifinin 10/2 maddesine göre yasal arınma süresi aşılamadan sonra asgari 28 gündür.

**Saklama Koşulları:** +2/+8 °C' de ve karanlıkta muhafaza edilmelidir.

**Ambalaj Şekli:** 50 ve 100 ml lik renkli ve tip II cam şişelerde (European Pharmacopoeia, 2005 3.2.1-3.2.2) silikon tapalı ve alüminyum kapaklı olarak 20 ve 40 koyun dozu, 10 ve 20 sığır dozu şeklinde ambalajlanmıştır.

**İmha Şartları:** Kullanım şartlarına haiz olmayan aşilar, (yüksek ısı veya güneş ışığına maruz kalmış, donmuş, ambalaj bütünlüğü bozulmuş, kapak, tapa veya etiket orijinalliğini yitirmiş) üretici kurum olan Dollvet A.Ş.' ne bildirilir. Aşilar otoklavda sterilize edildikten sonra boşaltılır, boşalan şişeler cam konteynıra atılır.

**“SADECE VETERİNER KULLANIM İÇİNDİR”**

**Üretici Firma :**

DOLLVET Veteriner Aşı, İlaç, Biyolojik Madde Üretimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
Organize Sanayi Bölgesi 8. Cadde ŞANLIURFA  
Tel : 0 414 369 11 33 • Fax : 0 414 369 16 62  
www.dollvet.com.tr • dollvet@dollvet.com.tr



# TETRANDOLL



Kombine Enterotoksemi, Enfeksiyöz  
Nekrotik Hepatit ve Yanıkara Aşısı



Cl. perfringens tip C • Cl. perfringens tip D  
Cl. oedematiens tip A • Cl. chauvoei

## TETRANDOLL AŞI PROSPEKTÜSÜ

**Kompozisyon:** Cl. perfringens tip C, Cl. perfringens tip D, Cl. oedematiens tip A ve Cl. chauvoei kültürleri ile hazırlanıp, formol ile toksin inaktivasyonuna tabi tutulmuş, alüminyum hidroksit ile adjuvantlanmış, fenol katılmış, anakültür konsantre toksoid tetravalan bir aşıdır.

**Endikasyonları ve Kontraendikasyonları:** Koyun ve keçilerde Enterotoksemi'ler, Enfeksiyöz Nekrotik Hepatit, Yanıkara, kuzu ve oğlaklarda Enterotoksemiler, sığırlarda Enterotoksemiler ve Yanıkara' ya karşı koruyucu amaç ile uygulanır. Hasta veya inkubasyon periyodundaki hayvanlara uygulanmamalıdır.

**Uygulama ve Dozaj:** Aşı; koyun, keçi, kuzu ve oğlaklarda skapula gerisindeki yünsüz ve hareketsiz bölgeye, sığır ve buzağılarda ise omuz gerisinde hareketsiz bölgeye derialtı uygulanır. Aşı 21 gün ara ile koyun ve keçilere 1,5+1 ml, kuzu ve oğlaklara 1+0,5 ml, sığırlara 3+2 ml dozlarında Enterotoksemi ve Yanıkara' ya karşı uygulanır. Daha önce aşılanmış koyun, keçi, kuzu, oğlak, sığır ve buzağuların 6 ay sonra aşılamada bildirilen tek doz aşı ile aşılanmaları yeterlidir. Sığırlar eğer Yanıkara' ya karşı aşılanacaklar ise 3 ml lik tek doz yeterlidir.

### Aşılamada Programı

HAYVAN TÜRÜ	AŞI UYGULAMA YERİ	AŞI DOZU ve AŞILAMA PERİYODU		
		1.AŞILAMA	2.AŞILAMA (21 gün sonra)	3.AŞILAMA (6 ay sonra)
KOYUN /KEÇİ	Koltuk altı yünsüz ve hareketsiz bölge	1,5 ml	1 ml	1,5 ml
KUZU/OĞLAK	Koltuk altı yünsüz ve hareketsiz bölge	1 ml	0,5 ml	1 ml
SIĞIR (Enterotoksemi + Yanıkara)	Koltuk altı yünsüz ve hareketsiz bölge	3 ml	2 ml	3 ml
SIĞIR ( Yanıkara)	Koltuk altı yünsüz ve hareketsiz bölge	3 ml	1 yıl sonra 3 ml	
BUZAĞI (Enterotoksemi + Yanıkara)	Koltuk altı yünsüz ve hareketsiz bölge	1,5 ml	1 ml	1,5 ml